

Aves de la Vereda La Laja

Laura Nathalia Hurtado Sierra & Luisa Valeria Morales Diaz

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Fotos: Laura Nathalia Hurtado Sierra. Producido por Laura Nathalia Hurtado Sierra [lauranathaliahurtado@gmail.com] y Luisa Valeria Morales Diaz con la asistencia de Juliana Philipp y Rayane Ribeiro, Field Museum. Leyenda: Macho (M), Hembra (H), Inmaduro (Inm), Endémico (E), Casi Endémico (CE), Abundante (A), Común (C), Poco Común (PC) y Migratorio (Mi).



©Field Museum (2024) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar/
compartir/remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1584] versión 1 4/2024



1 *Rupornis magnirostris* (Inm, A)
ACCIPITRIDAE
Gavilán caminero

Común en bosques y áreas abiertas a todas elevaciones. Visto con frecuencia.



2 *Coragyps atratus* (A)
CATHARTIDAE
Gallinazo común

Regularmente en ciudades, vertederos, borde de bosque y humedales.



3 *Leptotila verreauxi* (C)
COLUMBIDAE
Camimera colipinta

Común en bosques, claros y áreas semiabiertas, vegetación secundaria, matorrales y áreas agrícolas.



4 *Ortalis columbiana* (E, C)
CRACIDAE
Guacharaca colombiana

Frecuente en vegetación secundaria y zonas arboladas, así como en parques, jardines y plantaciones.



5 *Ortalis columbiana* (Inm, E, C)
CRACIDAE
Guacharaca colombiana



6 *Crotophaga ani* (C)
CUCULIDAE
Garrapatero piquiliso

Común en áreas abiertas, pastizales y matorrales en zonas agrícolas. Grupos ruidosos y notables.



7 *Spinus psaltria* (M, C)
FRINGILLIDAE
Jilguero aliblanco

Común en áreas boscosas, tierras de cultivo, parque y jardines de montaña.



8 *Spinus psaltria* (H, C)
FRINGILLIDAE
Jilguero aliblanco



9 *Eufonia lanirostris* (H, A)
FRINGILLIDAE
Eufonia gorgiamarilla

Común en bosques y bordes. Visita comederos de frutas.



10 *Sturnella magna* (M, C)
ICTERIDAE
Chirlobirlo

Frecuente en zonas abiertas, pastizales, granjas ganaderas y áreas con poca vegetación.



11 *Sturnella magna* (H, C)
ICTERIDAE
Chirlobirlo



12 *Sturnella magna* (Inm, C)
ICTERIDAE
Chirlobirlo

Aves de la Vereda La Laja

Laura Nathalia Hurtado Sierra & Luisa Valeria Morales Diaz

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Fotos: Laura Nathalia Hurtado Sierra. Producido por Laura Nathalia Hurtado Sierra [lauranathaliahurtado@gmail.com] y Luisa Valeria Morales Diaz con la asistencia de Juliana Philipp y Rayane Ribeiro, Field Museum. Leyenda: Macho (M), Hembra (H), Inmaduro (Inm), Endémico (E), Casi Endémico (CE), Abundante (A), Común (C), Poco Común (PC) y Migratorio (Mi).



©Field Museum (2024) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar/
compartir/ remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1584] versión 1 4/2024



13 *Icterus chrysater* (C)
ICTERIDAE
Turpial montañero

Común y conspicuo en áreas boscosas abiertas, plantaciones y parques.



14 *Mimus gilvus* (A)
MIMIDAE
Sinsote común

Común y conspicuo en áreas abiertas arboladas, bordes, matorrales, zonas ganaderas y vegetación semidesértica, así como en áreas urbanas.



15 *Colinus cristatus*
(Izq: H, Der: M) (C)
ODONTOPHORIDAE
Perdiz común o Chilindra

Común en áreas abiertas, matorrales, sabanas y pastizales. Fácil de observar.



16 *Atlapetes albofrenatus* (CE, PC)
PASSERELLIDAE
Atlapetes bigotudo

Común en bosques arbustivos subtropicales y bordes boscosos. Así como en vegetación secundaria y rastrojos.



17 *Zonotrichia capensis* (M, A)
PASSERELLIDAE
Copetón común

Común en zonas agrícolas, matorrales, zonas arboladas, pastizales, áreas urbanas y bordes



18 *Zonotrichia capensis*
(Izq: H, Der: Inm) (A)
PASSERELLIDAE
Copetón común



19 *Setophaga fusca* (M, A, Mi)
PARULIDAE
Reinita gorginaranja

Común en bosque montano y bordes. Especie más abundante del género en los Andes, especialmente en áreas montañosas.




20 *Setophaga fusca* (H, A, Mi)
PARULIDAE
Reinita gorginaranja



21 *Colaptes punctigula*
(Izq: M, Der: H) (C)
PICIDAE
Carpintero buchipecoso

Común en bosques, vegetación secundaria, áreas semiabiertas, plantaciones, palmerales y jardines.



22 *Dryocopus lineatus* (H, A)
PICIDAE
Carpintero real

Frecuente en bosques secundarios, semiabiertos y plantaciones con árboles altos.



23 *Picumnus olivaceus* (H, PC)
PICIDAE
Carpinterito oliváceo

Común en bosques secundarios, bordes, alrededor de claros y plantaciones.



24 *Coereba flaveola* (A)
THRAUPIDAE
Mielero común

Frecuente en interior y dosel de bosques, así como en bordes, vegetación secundaria, plantaciones, jardines y parques. Característico por ser nectarívoro.

Aves de la Vereda La Laja

Laura Nathalia Hurtado Sierra & Luisa Valeria Morales Diaz

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Fotos: Laura Nathalia Hurtado Sierra. Producido por Laura Nathalia Hurtado Sierra [lauranathaliahurtado@gmail.com] y Luisa Valeria Morales Diaz con la asistencia de Juliana Philipp y Rayane Ribeiro, Field Museum. Leyenda: Macho (M), Hembra (H), Inmaduro (Inm), Endémico (E), Casi Endémico (CE), Abundante (A), Común (C), Poco Común (PC) y Migratorio (Mi).



©Field Museum (2024) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar/
compartir/remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1584] versión 1 4/2024



25 *Coereba flaveola* (Inm, A)
THRAUPIDAE
Mielero común



26 *Sporophila nigricollis* (M, A)
THRAUPIDAE
Espiguero capuchino

Común en gran parte de Colombia.
Frecuente matorrales y especialmente
en pastizales de espigas altas.



27 *Sporophila nigricollis* (H, A)
THRAUPIDAE
Espiguero capuchino



28 *Stelpnia cyanicollis* (C)
THRAUPIDAE
Tángara real

Común en bordes de bosque,
plantaciones y jardines en los
Andes.



29 *Stelpnia cyanicollis* (Inm, C)
THRAUPIDAE
Tángara real



30 *Stelpnia heinei* (H, C)
THRAUPIDAE
Tángara capirozada

Común en bosques, borde de bosque,
plantaciones y jardines. Localmente
común en los Andes.



31 *Stelpnia heinei*
(Izq: M, Der: H) (C)
THRAUPIDAE
Tángara capirozada



32 *Stelpnia vitriolina* (CE, A)
THRAUPIDAE
Tángara rastrojera



33 *Thraupis episcopus* (A)
THRAUPIDAE
Azulejo común

Frecuente en áreas abiertas, bordes,
vegetación secundaria, matorrales y
zonas arboladas en todo el país.



34 *Tiaris olivaceus* (M, A)
THRAUPIDAE
Semillero cariamarillo

Común en abiertas, plantaciones,
áreas agrícolas, jardines y pastizales
en los Andes.



35 *Tiaris olivaceus* (H, A)
THRAUPIDAE
Semillero cariamarillo



36 *Amazilia franciae* (M, C)
TROCHILIDAE
Amazilia andino

Frecuente en bosques, borde de
bosque y jardines en los Andes.

Aves de la Vereda La Laja

Laura Nathalia Hurtado Sierra & Luisa Valeria Morales Diaz

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Fotos: Laura Nathalia Hurtado Sierra. Producido por Laura Nathalia Hurtado Sierra [lauranathaliahurtado@gmail.com] y Luisa Valeria Morales Diaz con la asistencia de Juliana Philipp y Rayane Ribeiro, Field Museum. Leyenda: Macho (M), Hembra (H), Inmaduro (Inm), Endémico (E), Casi Endémico (CE), Abundante (A), Común (C), Poco Común (PC) y Migratorio (Mi).



©Field Museum (2024) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar/
compartir/ remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1584]

versión 1 4/2024



37 *Amazilia cyanifrons* (H, E, C)
TROCHILIDAE
Amazilia ciáneo

Localmente común en borde de bosque, plantaciones y jardines.



38 *Troglodytes aedon* (A)
TROGLODYTIDAE
Cucarachero común

Frecuente en áreas abiertas. Especialmente abundante alrededor de las casas y ranchos. Cucarachero más común en Colombia.



39 *Turdus fuscater* (M, A)
TURDIDAE
Mirla común

Abundante en áreas abiertas en tierras altas, páramos, tierras agrícolas. La mirla más grande de Colombia.



40 *Elaenia flavogaster* (A)
TYRANNIDAE
Elaenia copetona

Común en bosques y bordes arbolados, vegetación secundaria, parques, jardines y áreas ligeramente.



41 *Elaenia frantzii* (A)
TYRANNIDAE
Sinsote común

Común en borde de bosques montanos y matorrales, así como en vegetación secundaria.



42 *Elaenia frantzii* (Inm, A)
TYRANNIDAE
Sinsote común



43 *Tyrannus melancholicus* (A)
TYRANNIDAE
Sirirí común

Abundante en áreas boscosas abiertas, bordes de bosque, plantaciones, bosques de ribera, jardines y parques.